

**FUJI-ONE 40 EC**

Fungicida - Agrícola

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**Ingrediente activo:**


Isoprothiolane 400 g/L

Ingredientes aditivos..... c.s.p. 1 Litro

CARACTERÍSTICAS:

FUJI-ONE 40 EC es un fungicida sistémico con propiedades tanto curativas como protectantes, actúa en los hongos en las etapas de penetración y crecimiento de las hifas infectadas en el lugar de la germinación de los conidios y formación del apresorio. Es absorbido por las hojas raíces, y translocado a la planta acropétala y basipétala.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Ingredientes activos	Isoprothiolane
Nombre Químico (IUPAC)	Di-isopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate
Formulación	Concentrado Emulsionable EC
Concentración	Isoprothiolane 400 gr/L
Nombre Comercial	FUJI-ONE 40 EC / FUJI-ONE® 40 EC
Numero de registro	SENASAG 918
Formula Estructural	
Formula Empírica	C ₁₂ H ₁₈ O ₄ S ₂
Grupo Químico	Dithiolan
PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN	
Estado Físico	Líquido
Explosividad	No explosivo
Densidad de la formula	1.02 g/mL (20°C)
Categoría toxicológica:	Categoría II “Moderadamente Peligroso”



Precauciones y advertencias de uso y aplicación

- Usar ropa adecuada de protección Como: Overol, guantes, botas, y careta.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No permita animales en el área tratada.
- Los equipos de aplicación deben ser previamente calibrados.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. Teléfono de emergencias toxicológicas durante las 24 horas del día (800-10-6966). Línea gratuita en todo el país.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros, retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.
- FUJI-ONE 40 EC es moderadamente peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Medidas de Primeros Auxilios

Contacto ocular: Lave los ojos afectados durante varios minutos. Si tiene lentes de contacto retirar si es posible y continuar enjuagando. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto dermal: Retire la ropa contaminada. Enjuague y luego lave el área afectada con agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

En caso de Ingestión: Si es ingerido, lave la boca con agua y proporcione uno a dos vasos de agua para ser tomada. Mantenga al paciente en reposo mientras consigue asistencia médica.

En caso de Inhalación: Lleve a un lugar con aire fresco. Consiga asistencia médica si observa efectos adversos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Mecanismo de acción: FUJI-ONE 40 EC es un fungicida que Inhibe el proceso de penetración (Efecto preventivo) y retiene la elongación de hifas infectivas (efecto curativo) mediante la inhibición de la formación de fosfolípidos.

Modo de acción; FUJI-ONE 40 EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativo temprano que controla una amplia gama de hongos patógenos en diversos cultivos. Se aplica antes de la aparición de la enfermedad con efectos curativos cuando la aplicación se hace con incidencia de esta.

FUJI-ONE 40 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Fungicida Agrícola

Código: FT-BOL-ISO Versión: 01

**NICHINO**

NIHON NOHYAKU ANDICA S.A.S.

“CONSULTE A UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Dosis	Plagas que controla	¹ U.A.C.	² LMR	³ PR
Tomate	1 – 1.25 L/ha	Pasma Amarillo <i>Alternaria solani</i>	7 días	0.01 mg/kg	24 horas
Papa	1.25 – 2 L/ha	Pasma Amarillo <i>Alternaria solani</i>			
Arroz	1 – 1,5 L/ha	Mal del cuello <i>Pyricularia oryzae</i>			

¹U.A.C.: Última Aplicación Antes de la Cosecha . ²LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm). ³PR: Periodo de entrada.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fitocompatibilidad con el producto que se desea mezclar. **FUJI-ONE 40 EC** en las dosis y frecuencia recomendadas es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.